

**哥伦比亚特区政府卫生部**  
( GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA )  
( DEPARTMENT OF HEALTH )



**人类乳头状病毒 (HPV) 疫苗拒绝接受证书**

**表格填写指南**

**第一部分：**输入学生信息。

**第二部分：**在阅读人类乳头状病毒 (HPV) 信息说明之后，请家长/监护人或学生(如果年满 18 岁或 18 岁以上) 签名并注明日期。

<b>第一部分：输入学生信息。</b>			
学校名称：			
学生姓名：	出生日期：	年级：	
街道地址：	城市/州：	邮编：	电话：
医疗提供者的姓名和地址：	城市/州：	邮编：	电话：

从 2009 年开始，根据华府（哥伦比亚特区）法律第 17 章第 10 条（2007 年人类乳头状病毒疫苗接种和报告法令），在华府（哥伦比亚特区）的一所学校首次注册 6、7、和 8 年级的女生的家长或法定监护人必须提交该学生已有的证书：

1. 接种过人类乳头状病毒 (HPV) 疫苗；或
2. 没有接种过人类乳头状病毒 (HPV) 疫苗，因为：
  - a. 家长或监护人诚实地写信给学校的主要官员表示反对，说明该接种违背他或她的宗教信仰；
  - b. 该学生的医生、他或她的代表或公共卫生人士已向学校提供了书面证明，说明该接种在医学上是不可取的；或
  - c. 家长或法定监护人，根据他或她的判断，通过签署一项申明说明该家长或法定监护人已被告知人类乳头状病毒 (HPV) 疫苗接种要求并决定不参加，选择退出人类乳头状病毒 (HPV) 疫苗接种计划。

**第二部分：学生信息**

**人类乳头状病毒 (HPV) 疫苗拒绝书**

我已收到并阅读了所提供的关于人类乳头状病毒 (HPV) 和，如果青春期前的女孩接种人类乳头状病毒 (HPV) 疫苗，可以预防宫颈癌和生殖系统的疣的好处的信息。在被告知感染人类乳头状病毒 (HPV) 的风险和人类乳头状病毒 (HPV) 和宫颈癌的关联后，我已决定让上面提到的学生不接种人类乳头状病毒 (HPV) 疫苗。我知道我可以随时重新处理这个问题并完成所要求的接种。

\_\_\_\_\_  
家长/监护人或学生(如果年满 18 岁或 18 岁以上)的签名

\_\_\_\_\_  
日期

\_\_\_\_\_  
家长/监护人或学生 (如果年满 18 岁或 18 岁以上) 的印刷体签名

哥伦比亚特区政府卫生部  
( GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA )  
( DEPARTMENT OF HEALTH )



人类乳头状病毒 ( HPV ) 信息说明

生殖系统的人类乳头状病毒 ( HPV ) 是在美国最常见的性传播病毒。大约有 100 种人类乳头状病毒 ( HPV )。大多数感染不会引起任何症状并自己消失。人类乳头状病毒 ( HPV ) 之所以重要, 主要是它能导致妇女患宫颈癌以及男性和女性中的几种比较不常见类型的癌症。它会导致生殖系统的疣和上呼吸道的疣。目前还没有治疗人类乳头状病毒 ( HPV ) 的方法, 但是它所导致的症状可以被医治。

美国大约有 2 千万人已被感染, 并且每年大约有额外的 620 万人被感染。人类乳头状病毒 ( HPV ) 通过性接触传播。超过 50% 的性生活活跃的男性和女性在一生中的某个时刻感染上人类乳头状病毒 ( HPV )。美国每年有大约 10000 名妇女患宫颈癌, 3700 人死于该病, 华府 ( 哥伦比亚特区 ) 患宫颈癌的比率要高于全国的平均数。

人类乳头状病毒 ( HPV ) 疫苗是一种不活跃的疫苗 ( 没有生命 ), 能预防 4 种主要的人类乳头状病毒 ( HPV )。这包括 2 种会导致大约 70% 的宫颈癌的类型和 2 种导致大约 90% 的生殖系统的疣的类型。人类乳头状病毒 ( HPV ) 疫苗能够预防大多数的生殖系统的疣和大多数的宫颈癌。

保护预防被预计将持续长久, 但接种疫苗的妇女仍然需要进行宫颈癌筛查因为疫苗不能预防导致宫颈癌的所有人类乳头状病毒 ( HPV ) 的类型。

通常建议 11 至 12 岁的女孩接种人类乳头状病毒 ( HPV ) 疫苗。医生可能会让小至 9 岁的女孩接种该疫苗。女孩在初次性接触之前接种人类乳头状病毒 ( HPV ) 疫苗尤为重要因为她们从未接触过人类乳头状病毒 ( HPV )。对这些女孩而言, 疫苗能够预防所针对的 4 中类型的人类乳头状病毒 ( HPV ) 导致的几乎 100% 的疾病。然而, 如果一名女孩或妇女已经感染了一种人类乳头状病毒 ( HPV ), 疫苗将不能预防那种类型导致的疾病。但是仍然建议携带人类乳头状病毒 ( HPV ) 的女孩或妇女接种疫苗。

13 至 26 岁的女孩和妇女在年幼时没有接种过该疫苗, 因此也建议她们接种该疫苗。可以和任何其它所需要的疫苗一起接种。

**人类乳头状病毒 ( HPV ) 疫苗按 3 剂量的系列被给予:**

- 第 1 剂: 现在
- 第 2 剂: 第 1 剂之后的 2 个月
- 第 3 剂: 第 1 剂之后的 6 个月

对酵母菌产生威胁生命的过敏反应的人、孕妇、和/或中度至严重的疾病的患者不应该接种疫苗。副作用大多是轻微的, 包括瘙痒、疼痛、注射部位发红和轻度至中度的发热。

---

如果您需要更多的信息, 请联系您的医疗提供者。您也可以致电 ( 202 ) 576-9342 联系华府卫生免疫规划部 ( Department of Health Immunization Program ) 或致电 1-800-CDC-INFO ( 1-800-232-4634 ) 联系疾病控制和预防中心 ( CDC )。