



ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ተፈላጊ ክትባቶች¹



የትምህርት ዓመት 2016-2017

በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ት/ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ሁሉ ወቅቱን እየጠበቀ ተገቢ መራራቅን እየተከተለ የተሰጠ ክትባት የተከተቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ትምህርት ቤት በሚከፈትበት ዕለት ማቀረብ አለባቸው።

2 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ **Preschool or Head Start** (ቅድመ ትምህርት ወይም የትምህርት መሠረት መጣያ) የሚገባ ልጅ

- 4 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
- 3 ለምሽ (Polio)
- 1 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ²
- 1 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps, Rubella)
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
- 3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)³
- 4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

4 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ **Pre – Kindergarten** (ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP) (DTaP)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ²
- 2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps & Rubella (MMR))
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
- 3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)³
- 4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

እድሜው ከ 5 – 10 ዓመት የሆነው ተማሪ **Kindergarten thru Fifth Grade** (ከቅድመ መዋዕለ ሕጻናት እስከ አምስተኛ) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ²
- 2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps, Rubella (MMR))
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A (በ 01/01/05 ወይም ከዚህ በኋላ የተወለደ ከሆነ)

እድሜው 11 ዓመት እና ከዚህም በላይ የሆነው ከ **Sixth through 12th Grade** (ከስድስተኛ እስከ 12ተኛ ክፍል) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td)
- 1 (Tdap)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) – ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ²
- 2 Measles, Mumps & Rubella (MMR) ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 1 ማጅራት ገትር የሚያስከትል ቫይረስ (Meningococcal)
- 3 አባለ ዘር አካባቢ የሚወጣ ኪንታሮት እና የማሕጸን ነቀረሳ መከላከያ ክትባት (Human Papillomavirus Vaccine (HPV))

¹ሁሉም ዕድሜዎች እና የክፍል ደረጃዎች፣ ሊሰጥ የሚፈለገው የመድኃኒት ልክ መጠን በዛጅ በልጅ ዕድሜ እና ከምን ያህል ጊዜ በፊት ተከትበው በነበረበት የጊዜ ርዝመት መሠረት በማድረግ ይለያያዛል። ለገርዝር ጉዳዩ ከልጅዎ ትምህርት ቤት ነርስ ወይም የጤና ሞገዚት ጋር እባክዎን ይነጋግሩ።

²ሁሉም የ Varicella/chickenpox (ኩፍኝ) በሽታዎች በጤና ሞገዚት ተንከባካቢ (MD, NP, PA, RN) ባለሙያ መረጋገጥ/መመርመር ያለበት ሲሆን፣ የሚቀርበውም መረጃ በሽታው ለምን ያህል ወር እና ዓመት እንደቆየ መያዝ አለበት።

³ የክትባቱ ልክ መጠን ቁጥር የሚወሰነው በሚሰጠው የመድኃኒቱ ዕይነት ነው።



ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ተፈላጊ ክትባቶች¹



የትምህርት ዓመት 2016-2017

በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ት/ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ሁሉ ወቅቱን እየጠበቀ ተገቢ መራራቅን እየተከተለ የተሰጠ ክትባት የተከተቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ትምህርት ቤት በሚከፈትበት ዕለት ማቀረብ አለባቸው።

2 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ **Preschool or Head Start** (ቅድመ ትምህርት ወይም የትምህርት መሠረት መጣያ) የሚገባ ልጅ

- 4 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
- 3 ለምሽ (Polio)
- 1 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ²
- 1 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps, Rubella)
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
- 3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)³
- 4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

4 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ **Pre – Kindergarten** (ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP) (DTaP)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ²
- 2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps & Rubella (MMR))
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
- 3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)³
- 4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

እድሜው ከ 5 – 10 ዓመት የሆነው ተማሪ **Kindergarten thru Fifth Grade** (ከቅድመ መዋዕለ ሕጻናት እስከ አምስተኛ) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ²
- 4 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps, Rubella (MMR))
- 5 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A (በ 01/01/05 ወይም ከዚህ በኋላ የተወለደ ከሆነ)

እድሜው 11 ዓመት እና ከዚህም በላይ የሆነው **h Sixth through 12th Grade** ከ ስድስተኛ እስከ 12ተኛ ክፍል) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td)
- 1 (Tdap)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) – ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ²
- 4 Measles, Mumps & Rubella (MMR) ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ
- 5 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 1 ማጅራት ገትር የሚያስከትል ቫይረስ (Meningococcal)
- 3 አባለ ዘር አካባቢ የሚወጣ ኪንታሮት እና የማሕጸን ነቀረሳ መከላከያ ክትባት (Human Papillomavirus Vaccine (HPV))

¹ሁሉም ዕድሜዎች እና የክፍል ደረጃዎች፣ ሊሰጥ የሚፈለገው የመድኃኒት ልክ መጠን ብዛት በልጅ ዕድሜ እና ከምን ያህል ጊዜ በፊት ተከትለው በነበረበት የጊዜ ርዝመት መሠረት በማድረግ ይለያያዛል። ለዝርዝር ጉዳዩ ከልጅዎ ትምህርት ቤት ነርስ ወይም የጤና ሞግዚት ጋር እባክዎን ይነጋግሩ።

²ሁሉም የ Varicella/chickenpox (ኩፍኝ) በሽታዎች በጤና ሞግዚት ተንከባካቢ (MD, NP, PA, RN) ባለሙያ መረጋገጥ/መመርመር ያለበት ሲሆን፣ የሚቀርበውም መረጃ በሽታው ለምን ያህል ወር እና ዓመት እንደቆየ መያዝ አለበት።።

³ የክትባቱ ልክ መጠን ቁጥር የሚወሰነው በሚሰጠው የመድሀኒቱ ዕይነት ነው።