



Exigences du District de Columbia en matière de vaccinations¹

Année scolaire 2016 – 2017



Tous les élèves fréquentant une école du District de Columbia doivent présenter, dès le premier jour de classe, une preuve des vaccins effectués avec les délais appropriés entre chaque injection.

Un enfant de 2 ans ou plus entrant en Préscolaire ou Head Start

4 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP)
3 Polio
1 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie²
1 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR)
3 Hépatite B
2 Hépatite A
3 ou 4 Hib (Haemophilus influenza de type B)³
4 PCV (pneumocoque)

Un élève de 4 ans entrant en Pré-maternelle

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP)
4 Polio
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie²
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR)
3 Hépatite B
2 Hépatite A
3 ou 4 Hib (Haemophilus influenza de type B)³
4 PCV (pneumocoque)

Un élève de 5-10 ans entrant en Classe de maternelle à 5^e année

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP)
4 Polio
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie²
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR)
3 Hépatite B
2 Hépatite A (si né le ou après le 01/01/05)

Un élève de 11 ans ou plus entrant en Classe de 6^e à 12^e

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP/Td)
1 Tdap
4 Polio
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie²
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR)
3 Hépatite B
1 Méningocoque
3 Vaccin contre le virus du papillome humain (VPH)

¹ A tous les âges et classes, le nombre de doses exigé varie selon l'âge et le laps de temps écoulé depuis le dernier vaccin. Veuillez vous adresser à l'infirmière de l'école de votre enfant ou à son prestataire de santé pour obtenir plus de détails.

² Tous les antécédents pathologiques de varicelle DOIVENT être vérifiés/diagnostiqués par un prestataire de santé (MD, NP, PA, RN) et les documents DOIVENT inclure le mois et l'année de la maladie.

³ Le nombre de doses est déterminé par la marque



Exigences du District de Columbia en matière de vaccinations¹

Année scolaire 2016 – 2017



Tous les élèves fréquentant une école du District de Columbia doivent présenter, dès le premier jour de classe, une preuve des vaccins effectués avec les délais appropriés entre chaque injection.

Un enfant de 2 ans ou plus entrant en
Pré-scolaire ou Head Start

4 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP)
3 Polio
1 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie²
1 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR)
3 Hépatite B
2 Hépatite A
3 ou 4 Hib (Haemophilus influenza de type B)³
4 PCV (pneumocoque)

Un élève de 4 ans entrant en
Pré-maternelle

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP)
4 Polio
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie²
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR)
3 Hépatite B
2 Hépatite A
3 ou 4 Hib (Haemophilus influenza de type B)³
4 PCV (pneumocoque)

Un élève de 5-10 ans entrant en
Classe de maternelle à 5^e année

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP)
4 Polio
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie²
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR)
3 Hépatite B
2 Hépatite A (si né le ou après le 01/01/05)

Un élève de 11 ans ou plus entrant en
Classe de 6^e à la 12^e année

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP/Td)
1 Tdap
4 Polio
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie²
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR)
3 Hépatite B
1 Méningocoque
3 Vaccin contre le virus du papillome humain (VPH)

¹ À tous les âges et classes, le nombre de doses exigé varie selon l'âge et le laps de temps écoulé depuis le dernier vaccin. Veuillez vous adresser à l'infirmière de l'école de votre enfant ou à son prestataire de santé pour obtenir plus de détails.

² Tous les antécédents pathologiques de varicelle DOIVENT être vérifiés/diagnostiqués par un prestataire de santé (MD, NP, PA, RN) et les documents DOIVENT inclure le mois et l'année de la maladie.

³ Le nombre de doses est déterminé par la marque