



# ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ተፈላጊ ክትባቶች<sup>1</sup>

## የትምህርት ዓመት 2018-2019



በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ት/ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ሁሉ ወቅቱን እየጠበቀ ተገቢ መራራቅን እየተከተለ የተሰጠ ክትባት የተከተቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ትምህርት ቤት በሚከፈትበት ዕለት ማቀረብ አለባቸው።

2 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ **Preschool or Head Start** (ቅድመ ትምህርት ወይም የትምህርት መሠረት መጣያ) የሚገባ ልጅ

- 4 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
- 3 ለምሽ (Polio)
- 1 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ<sup>2</sup>
- 1 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps, Rubella)
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
- 3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)<sup>3</sup>
- 4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

4 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ **Pre – Kindergarten** (ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)(DTaP)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ<sup>2</sup>
- 2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps & Rubella (MMR))
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
- 3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)<sup>3</sup>
- 4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

እድሜው ከ 5 – 10 ዓመት የሆነው ተማሪ **Kindergarten thru Fifth Grade** (ከቅድመ መዋዕለ ሕጻናት እስከ አምስተኛ) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ<sup>2</sup>
- 2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps, Rubella (MMR))
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A (በ 01/01/05 ወይም ከዚህ በኋላ የተወለደ ከሆነ)

እድሜው 11 ዓመት እና ከዚህም በላይ የሆነው ከ **Sixth through 12<sup>th</sup> Grade** (ከስድስተኛ እስከ 12ተኛ ክፍል) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td)
- 1 (Tdap)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) – ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ<sup>2</sup>
- 2 Measles, Mumps & Rubella (MMR) ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 1 ማጅራት ገትር የሚያስከትል ቫይረስ (Meningococcal)
- 3 አባለ ዘር አካባቢ የሚወጣ ኪንታሮት እና የማሕጸን ነቀረሳ መከላከያ ክትባት (Human Papillomavirus Vaccine (HPV))

<sup>1</sup>ሁሉም ዕድሜዎች እና የክፍል ደረጃዎች፣ ሊሰጥ የሚፈለገው የመድኃኒት ልክ መጠን በሐኪም በልጅ ዕድሜ እና ከምን ያህል ጊዜ በፊት ተከትቦው በነበረበት የጊዜ ርዝመት መሠረት በማድረግ ይለያያል። ለገርዝር ጉዳዩ ከልጅዎ ትምህርት ቤት ነርስ ወይም የጤና ሞግዚት ጋር እባክዎን ይነጋግሩ።

<sup>2</sup>ሁሉም የ Varicella/chickenpox (ኩፍኝ) በሽታዎች በጤና ሞግዚት ተንከባካቢ (MD, NP, PA, RN) ባለሙያ መረጋገጥ/መመርመር ያለበት ሲሆን፣ የሚቀርበውም መረጃ በሽታው ለምን ያህል ወር እና ዓመት እንደቆየ መያዝ አለበት።

<sup>3</sup> የክትባቱ ልክ መጠን ቁጥር የሚወሰነው በሚሰጠው የመድኃኒቱ ዕይነት ነው።



# ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ተፈላጊ ክትባቶች<sup>1</sup>

## የትምህርት ዓመት 2018-2019



በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ት/ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ሁሉ ወቅቱን እየጠበቀ ተገቢ መራራቅን እየተከተለ የተሰጠ ክትባት የተከተቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ትምህርት ቤት በሚከፈትበት ዕለት ማቀረብ አለባቸው።

2 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ **Preschool or Head Start** (ቅድመ ትምህርት ወይም የትምህርት መሠረት መጣያ) የሚገባ ልጅ

- 4 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
- 3 ለምሽ (Polio)
- 1 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ<sup>2</sup>
- 1 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንጎት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps, Rubella)
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
- 3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)<sup>3</sup>
- 4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

4 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ **Pre – Kindergarten** (ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP) (DTaP)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ<sup>2</sup>
- 2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንጎት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps & Rubella (MMR))
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
- 3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)<sup>3</sup>
- 4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

እድሜው ከ 5 – 10 ዓመት የሆነው ተማሪ **Kindergarten thru Fifth Grade** (ከቅድመ መዋዕለ ሕጻናት እስከ አምስተኛ) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ<sup>2</sup>
- 4 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንጎት፣ የቆዳ በሽታ (Measles, Mumps, Rubella (MMR))
- 5 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A (በ 01/01/05 ወይም ከዚህ በኋላ የተወለደ ከሆነ)

እድሜው 11 ዓመት እና ከዚህም በላይ የሆነው **h Sixth through 12<sup>th</sup> Grade** ከ ስድስተኛ እስከ 12ተኛ ክፍል) የሚገባ ተማሪ

- 5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td)
- 1 (Tdap)
- 4 ለምሽ (Polio)
- 2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) – ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ<sup>2</sup>
- 4 Measles, Mumps & Rubella (MMR) ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንጎት፣ የቆዳ በሽታ
- 5 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
- 1 ማጅራት ጎትር የሚያስከትል ቫይረስ (Meningococcal)
- 3 አባለ ዘር አካባቢ የሚወጣ ኪንታሮት እና የማሕጸን ነቀረሳ መከላከያ ክትባት (Human Papillomavirus Vaccine (HPV))

<sup>1</sup>ሁሉም ዕድሜዎች እና የክፍል ደረጃዎች፣ ሊሰጥ የሚፈለገው የመድኃኒት ልክ መጠን ብዛት በልጅ ዕድሜ እና ከምን ያህል ጊዜ በፊት ተከትቦው በነበረበት የጊዜ ርዝመት መሠረት በማድረግ ይለያያዛል። ለዝርዝር ጉዳዩ ከልጅዎ ትምህርት ቤት ነርስ ወይም የጤና ሞግዚት ጋር እባክዎን ይነጋግሩ።

<sup>2</sup>ሁሉም የ Varicella/chickenpox (ኩፍኝ) በሽታዎች በጤና ሞግዚት ተንከባካቢ (MD, NP, PA, RN) ባለሙያ መረጋገጥ/መመርመር ያለበት ሲሆን፣ የሚቀርበውም መረጃ በሽታው ለምን ያህል ወር እና ዓመት እንደቆየ መያዝ አለበት።e.

<sup>3</sup> የክትባቱ ልክ መጠን ቁጥር የሚወሰነው በሚሰጠው የመድሀኒቱ ዕይነት ነው።