



Requisitos de Vacunación del Distrito de Columbia¹

Año Escolar 2018 - 2019



Todos los estudiantes que asisten a la escuela en el Distrito de Columbia deben presentar un certificado de vacunación con las dosis correspondientes el primer día de clases.

<p>Niños de 2 años de edad o más Preescolar o Head Start</p>	<p>4 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP) 3 Poliomielitis 1 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad² 1 Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR) 3 Hepatitis B 2 Hepatitis A 3 o 4 Hib (Haemophilus Influenza Tipo B)³ 4 PCV (Neumocócica)</p>
<p>Estudiantes de 4 años de edad Pre-Kínder</p>	<p>5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP) 4 Poliomielitis 2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad² 2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR) 3 Hepatitis B 2 Hepatitis A 3 o 4 Hib (Haemophilus Influenza Tipo B)³ 4 PCV (Neumocócica)</p>
<p>Estudiantes de 5 a 10 años de edad Kínder hasta Quinto grado</p>	<p>5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP) 4 Poliomielitis 2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad² 2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR) 3 Hepatitis B 2 Hepatitis A (si nació el 01/01/05 o después de esa fecha)</p>
<p>Estudiantes de 11 años de edad o más que ingresan a Sexto a Doceavo Grado</p>	<p>5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP/Td) 1 Tdap 4 Poliomielitis 2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad² 2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR) 3 Hepatitis B 1 Meningocócica 2 o 3 Vacuna contra el virus del Papiloma Humano (HPV)</p>

¹ En todas las edades y grados el número de dosis requeridas varía según la edad del niño(a) y de cuánto tiempo hace que fue vacunado(a). Consulte con la enfermera de la escuela de su hijo(a) o con un proveedor de atención médica para obtener información.

² Todos los antecedentes de varicela/viruela **DEBEN** ser verificados/diagnosticados por un proveedor de atención médica (médico, enfermera profesional, asistente médico, enfermera certificada) y la documentación DEBE incluir el mes y el año de la enfermedad.

³ La cantidad de dosis es determinada según la marca comercial utilizada.



Requisitos de Vacunación del Distrito de Columbia¹

Año Escolar 2018 - 2019



Todos los estudiantes que asisten a la escuela en el Distrito de Columbia deben presentar un certificado de vacunación con las dosis correspondientes el primer día de clases.

Niños de 2 años de edad o más
Preescolar o Head Start

4 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP)
3 Poliomielitis
1 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad²
1 Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR)
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A
3 o 4 Hib (Haemophilus Influenza Tipo B)³
4 PCV (Neumocócica)

Estudiantes de 4 años de edad
Pre-Kínder

5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP)
4 Poliomielitis
2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad²
2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR)
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A
3 o 4 Hib (Haemophilus Influenza Tipo B)³
4 PCV (Neumocócica)

Estudiantes de 5 a 10 años de edad
Kínder hasta Quinto grado

5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP)
4 Poliomielitis
2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad²
2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR)
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A (si nació el 01/01/05 o después de esa fecha)

Estudiantes de 11 años de edad o más que ingresan a
Sexto a Doceavo Grado

5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP/Td)
1 Tdap
4 Poliomielitis
2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad²
2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR)
3 Hepatitis B
1 Meningocócica
2 o 3 Vacuna contra el virus del Papiloma Humano (HPV)

¹ En todas las edades y grados el número de dosis requeridas varía según la edad del niño(a) y de cuánto tiempo hace que fue vacunado(a). Consulte con la enfermera de la escuela de su hijo(a) o con un proveedor de atención médica para obtener información.

² Todos los antecedentes de varicela/viruela DEBEN ser verificados/diagnosticados por un proveedor de atención médica (médico, enfermera profesional, asistente médico, enfermera certificada) y la documentación DEBE incluir el mes y el año de la enfermedad.

³ La cantidad de dosis es determinada según la marca comercial utilizada.